



Quando fare l'ecografia del Volto COMPLICANZE DA FILLER

QUANDO FARE L'ECOGRAFIA NEL VOLTO

In due situazioni:

- nelle zone rischiose del volto, **PRIMA** di effettuare il trattamento, per valutare arterie e vene.
- nelle complicanze da filler, **DOPO** il trattamento, per individuare le problematiche insorte nel volto.

NELLE ZONE RISCHIOSE DEL VOLTO

Con l'ecografia si ha una panoramica dettagliata dei tessuti molli del volto e soprattutto delle arterie e vene da individuare ed evitare nel trattamento iniettivo.

Per tale motivo, dovrebbe essere utilizzato preventivamente in tutte le aree a rischio del volto:

- naso (quando si effettua il RINOFILLER)
- occhiaie (passa un'arteria molto delicata)
- tempie (una zona subdola da trattare)
- mento (passa un'arteria collegata all'arteria linguale)

Si valuta l'area anatomica, si individuano le arterie e le vene della zona rischiosa e si segnano sul volto. Il trattamento iniettivo si esegue nel passaggio successivo.

NELLE COMPLICANZE DA FILLER

Dopo ogni trattamento iniettivo è normale episodi di gonfiore, lividi, arrossamento e/o grumi palpabili nelle aree trattate.

Tutto questo è da considerarsi "fisiologico" e, nella maggior parte di casi, si risolve spontaneamente in un

breve lasso di tempo. Alcune volte possono capitare complicanze da filler medio\gravi.

Queste devono essere affrontate tempestivamente e una delle prime indagini da fare è proprio la valutazione ecografica.

Le complicanze da prendere seriamente in considerazione sono:

- edema persistente o tardivo
- infezioni
- granulomi
- noduli grandi
- indurimento della zona trattata
- infiammazione della zona trattata
- occlusione arteriosa
- compressione venosa

queste ultime due complicanze sono le più importanti e tempestive da individuare e trattare

In tutte le suddette complicanze bisogna effettuare subito un'ecografia delle aree interessate e richiedere una visita medica specialistica.

Il medico, tramite lo studio delle immagini ecografiche, riesce ad esaminare tutti gli aspetti anatomici della zona interessata ed è in grado di determinare la posizione (sotto muscolare, sotto cutaneo, intra adiposo, sovraperiosteo),

le caratteristiche dell'impianto del filler (a bolo, a striscia, a gocce) e le sue caratteristiche (con edema, con infiammazione, con ematoma).

Una volta fotografata la situazione, il medico è in grado di attuare il giusto protocollo fornendo un'assistenza mirata e specifica per il tipo di problema riscontrato.

Dr.Lipbeauty® • +39 366 1133830 • info@lipbeauty.it • www.lipbeauty.it

Le informazioni contenute nel presente documento sono a puro scopo informativo generico. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute non costituiscono: 1) il consiglio del medico 2) una valutazione o 3) una consultazione. Né tale corrispondenza deve essere considerata come un sostituto di una valutazione medica formale e / o una consultazione del medico. Inoltre, le informazioni e la corrispondenza contenute in eventuali e-mail, sms o chat sui portali social, tra cui tutte le risposte, non sono e non creeranno un rapporto formale medico-paziente. I potenziali pazienti che desiderano una consultazione formale sono invitati a chiamare per un appuntamento.

I contenuti presenti su questo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del documento o di parte di esso, trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 C.P., Che ai sensi del d.Lgs. N. 196/2003. È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall'autore.

Copyright© 2016 - Dr.Lipbeauty® - www.lipbeauty.it®. All rights reserved